

**Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:**

MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśluborska 5A, 74-240 Lipiany

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia  
ryzyka dla ludzi i środowiska.**

**A L T A 500 SC**

Zawartość substancji czynnej:

**fluazynam** (związek z grupy pochodnych aniliny) - **500 g w 1 litrze środka (38,76 %)**

**Pozwolenie MRiRW Nr R -36/2013h.r. z dnia 19.07.2013 r.**



**Drażniący**



**Niebezpieczny dla środowiska**

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

**I OPIS DZIAŁANIA**

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka, cebuli przed mączniakiem rzekomym oraz kapusty białej i kapusty pekińskiej przed kiłą kapusty.

## II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

### 1. ROŚLINY ROLNICZE

#### ZIEMNIAK

alternarioza

**Zalecane dawki: 0,3-0,4 l/ha.**

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.

zaraza ziemniaka (nać i bulwy).

**Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.**

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek Alta 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

### 2. ROŚLINY WARZYWNE

#### A) CEBULA KONSUMPCYJNA

mączniak rzekomy.

**Zalecana dawka: 0,5 l/ha.**

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

#### UWAGA

Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.

#### B) CEBULA NASIENNA

mączniak rzekomy.

**Zalecana dawka: 0,5 l/ha.**

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Środek stosować 2-3 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

#### UWAGA:

Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

#### C) KAPUSTA BIAŁA, KAPUSTA PEKIŃSKA

kiła kapusty

Dezynfekcja podłoża.

**Zalecana dawka: 2 l/ha.**

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Podłoże (pole) opryskiwać przed posadzeniem rozsady, następnie wymieszać warstwę wierzchnią do głębokości 10 cm.

### Podlewanie.

**Zalecane stężenie; 0,05% (50 ml środka w 100 l wody)**

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml pod każdą roślinę.

Podlewać rozsądę po posadzeniu na stałe miejsce.

## **III OKRES KARENCJI**

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

ziemniaki - 7 dni

cebula konsumpcyjna - 28 dni

kapusta - nie dotyczy

## **IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ**

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

## **V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

## **VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

#### **UWAGA**

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

#### **VIII ANTIDOTUM**

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

#### **IX POMOC MEDYCZNA**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Kraków – (12) 411 99 99

Lublin – (81) 740 89 83

Łódź – (42) 657 99 00

Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Tarnów – (14) 631 54 09

Warszawa – (22) 619 66 54

Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....